



UDC 616.36-006.6-07

MARKUS PECK-RADOSAVLJEVIC

Klinikum Klagenfurt in Klagenfurt, Austria

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЕ

Гепатоцеллюлярная карцинома занимает второе место в структуре онкологической смертности в мире и в подавляющем большинстве случаев развивается у пациентов с имеющимся циррозом печени. Рассмотрены заболеваемость и смертность от ГЦК в контексте распростра-

ненности факторов риска (хронических вирусных гепатитов). Дан обзор доступных скрининговых методик – лабораторных (АФП) и инструментальных (УЗИ) и их эффективности. Приводятся рекомендации по скринингу и диагностике авторитетных международных организаций (EASL, AASLD, APASL).

Контакты: Маркус Пек-Радосавлевич, MD, профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии, эндокринологии и нефрологии в Клиникум Клагенфурт в Клагенфурте, Австрия. E-mail: markus@peck.at

Contacts: Markus Peck-Radosavljevic, MD, Professor, Chairman at the Department of Gastroenterology & Hepatology, Endocrinology and Nephrology at Klinikum Klagenfurt in Klagenfurt, Austria. E-mail: markus@peck.at