

УДК 616.36-006.6-085

В.В. БРЕДЕР

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина», г. Москва, Россия

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ

Лечение ГЦК представляет значительные трудности; смертность во многом обусловлена имеющимся заболеванием печени.

Согласно рекомендациям по лечению ГЦК EASL, лечение подбирается в зависимости от стадии по классификации рака печени Барселонской клиники (BCLC). Так, на ранней стадии возможны резекция и трансплантация печени, на промежуточной приводится обзор хирургических методов

лечения (резекция, трансплантация печени), радиочастотной абляции, на промежуточной – трансартериальной химиоэмболизации (ТАХЭ), на поздней – сорафениба.

Единственным системным агентом, доказавшим эффективность в лечении ГЦК, остается сорафениб. Исследования других препаратов закончились неудачей. По-видимому, перспективным является поиск биомаркеров и соответствующее назначение терапии.

Контакты: Бредер Валерий Владимирович, канд. мед. наук, старший научный сотрудник, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва, Россия. E-mail: vbreder@yandex.ru

Contacts: Valery V. Breder, Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Federal State Budgetary Institution "National medical research center of oncology n.a. by N.N. Blokhin", RAMS, Moscow, Russia. E-mail: vbreder@yandex.ru