



УДК 616.07-616.9

С.Ж. КАСЫМБЕКОВА*Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Алматы, Республика Казахстан*

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КО-ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В/ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Распространенность вирусного гепатита В (ВГВ) среди диспансерной группы людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в Казахстане, составляет 1,5 на 100 ЛЖВ. С одной стороны, тотальная иммунизация против ВГВ, проводимая в РК с 1991 года всем новорожденным, с другой стороны, доступ к повторной иммунизации ЛЖВ при постановке на диспансерный учет в центре по профилактике и борьбе со СПИД позволили резко снизить распространенность ВГВ среди ЛЖВ. В рутинном наблюдении все ЛЖВ проходят ежегодный скрининг ИФА на ВГВ.

Цель исследования – определить основные качественные параметры оказания медицинской помощи пациентам с ко-инфекцией ВИЧ/ВГВ, состоящих на диспансерном учете в Республике Казахстан (РК).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен срез-анализ диспансерной группы ЛЖВ в РК. Использовалась он-лайн база «Электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции в РК». Всего на учете состоит 669 пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При постановке на диспансерный учет всем ЛЖВ в рутинном порядке проводится исследование на маркеры вирусного гепатита В. При наличии показаний пациенту предлагается иммунизация на ВГВ. У 10 ЛЖВ, прошедших иммунизацию, диагностирован ВГВ, что свидетельствует о несовершенном иммунитете на фоне ВИЧ-инфекции.

При диагностике хронического ВГВ у ЛЖВ, согласно Клиническим протоколам лечения ВИЧ-инфекции, пациент должен немедленно начать антиретровирусную терапию (АРТ) с препаратом тенофовир. Тенофовир, входящий в состав стандартной АРТ, имеет прекрасные противовирусные свойства против вируса гепатита В. Из 669 пациентов с ко-инфекцией получает АРТ только 448 ЛЖВ (67%). Из них получает схему АРТ с тенофовиром 201 человек – 45% от числа пациентов на АРТ и 30% от числа всех пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГВ.

ВЫВОД

Необходимо усилить работу по привлечению ЛЖВ с вирусным гепатитом В к лечению антиретровирусными препаратами, используя в схеме АРТ препарат тенофовир.

Контакты: Касымбекова Сайранкуль Жузбаевна, заведующая отделом клинического мониторинга Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД, г. Алматы. Тел.: + 7 (727) 375 62 25, e-mail: zsayra@mail.ru.

Contacts: Sayranulkul Zh. Kasymbekova, Head of the Clinical Monitoring Department of the Republican AIDS Center, Almaty c. Ph.: + 7 (727) 375 62 25, e-mail: zsayra@mail.ru