

УДК 614.253.5-616.7-616-07

АНАЛИЗ ВЛАДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВАЛИДНЫМИ ШКАЛАМИ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

М.М. САГАДИЕВА, М.В. ГОРЕМЫКИНА

Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан

В мировой практике деятельность медицинских сестер ревматологического профиля имеет четко структурированную систему, включающую в себя многие задачи, в том числе широкий спектр клинических навыков, традиционно выполняемых ревматологами. Такие компетенции, как оценка активности ревматологических заболеваний (РЗ) с использованием международных индексов являются ежедневной практикой в работе медицинской сестры за рубежом. В нашей стране перечень компетенций и роль медсестры ревматологического профиля не достаточно ясны в связи с отсутствием исследований в данной области медицины.

Цель. Определить базовый уровень владения медицинскими сестрами шкалами оценки активности ревматологического заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Дизайн: одномоментное поперечное исследование методом анкетирования. Выборка – сплошная. В исследование вошли медсестры ревматологического профиля (РП) на уровне стационарной помощи на базе Медицинского Центра ГМУ г. Семей, кардиоревматологическое отделение (n=9); и медсестры на уровне первично медико-санитарной помощи (ПМСП), ведущей прием с врачом-ревматологом на базе консультативных поликлиник г. Семей (n=6): «Поликлиника Медицинского Центра ГМУ г. Семей», «Хаким», «Поликлиника №1 смешанного типа г. Семей», «Поликлиника №6 смешанного типа г. Семей», «Консультативно-диагностический центр г. Семей».

Всего проанкетировано 15 медсестер.

Для оценки владения медсестрой ревматологического профиля валидными шкалами проводился анализ владения

индексами оценки активности ревматологического заболевания по следующим шкалам: визуально-аналоговая шкала (ВАШ), SELENA/SLEDAI, WOMAC, DAS-28, BASDAI.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты анализа данных показали, что определением активности ревматологического заболевания по шкале ВАШ среди медсестер на уровне стационарной помощи владеют 77% (n=7) респондентов, на уровне ПМСП владеют 66% (n=4) медсестер.

Владение международными индексами измерения активности ревматологического заболевания, такими как шкала SELENA/SLEDAI, WOMAC, DAS-28, BASDAI, у стационарных медсестер РП выглядело следующим образом: владеют лишь 23% (n=2) респондентов, 77% (n=7) респондентов ответили отрицательно. Данные по медсестрам РП на уровне ПМСП показали, что шкалой SELENA/SLEDAI владеют 16% (n=1) респондентов, 84% (n=5) респондентов не имеют компетенции в работе с данной шкалой. По шкале WOMAC 66% (n=4) респондентов дали отрицательный ответ, 34% (n=2) затруднились с ответом. Шкалами DAS-28, BASDAI среди респондентов владеют только 17% (n=1), 66% (n=4) респондентов ответили отрицательно.

ВЫВОД

Таким образом, установлен высокий уровень знаний медицинских сестер стандартной шкалы ВАШ и низкий уровень знаний в области оценки активности РЗ с помощью международных шкал, что требует внимания к обучению, повышению и расширению практических навыков медицинских сестер в области ревматологии.